


ĐOÀN GIỎI

TÊ GIÁC
TRONG
NGÀN XANH

NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG



Tổ tông nhà hổ



Hổ là loài ăn thịt, xuất hiện vào đầu kỉ Đệ tam thuộc Nguyên Đại Tân sinh, là một trong những nhóm động vật có vú nguyên thủy cổ nhất.

Tổ tiên của hổ ngày nay là giống hổ không đuôi, răng kiếm, là Ma-hai-rô-đút (Mahairodus, theo tiếng cổ Hi Lạp “Ma-hai-ra” là kiếm, dao nhọn). Răng nanh của nó uốn như hình cái gươm. Về kích thước, Ma-hai-rô-đút to hơn nhiều các

giống hổ ở A-mua¹ hay Ben-gan², nó dám tấn công cả tê giác và voi. Miệng nó há rộng khủng khiếp, gần như thành một góc vuông và cắn dễ dàng những răng kiếm nhọn vào da dày của con mồi.

Từ đầu kỉ Đệ tứ về sau, có những băng kì ghê gớm. Giá rét đã ảnh hưởng đến thế giới động vật và thực vật. Con vật to lớn đầu tiên ở châu Âu rời nơi cư trú đi lần về những vùng nhiệt đới, có lẽ bắt đầu từ lúc băng kì cuối cùng, là con hổ răng kiếm. Và sau đó rất lâu, con sư tử và linh cẩu mới lên đường tiến về hướng Mi-đi, chắc là trước khi lưỡi đất Gi-bran-ta đứt đôi và Địa Trung Hải lại một lần nữa hoàn toàn chìm xuống vĩnh viễn cho tới giờ đây. Gấu, bò tót, hươu thì rút về phương Bắc (theo *Lịch sử các loài vật* của Ri-sa Lơ-vin-xơn và *Đời sống trái đất* của A. I-a-cốp-lép).

Có tác giả khác nói rằng con hổ ngày nay không dính líu gì đến con hổ không đuôi răng kiếm. Nhưng luận cứ còn mơ hồ, không vững chắc, nên tôi thấy không cần thiết dẫn vào đây.

Hổ được mang tên khoa học là *Panther a tigris* hay *Felix tigris*, là con vật mạnh nhất trong họ mèo.

1 A-mua: Amur, tên dòng sông lớn thứ mười thế giới, là biên giới tự nhiên giữa miền Viễn Đông của Nga và vùng Mãn Châu (tỉnh Hắc Long Giang) của Trung Quốc. Hổ Amur, còn có tên hổ Siberi, hổ Ussuri hay hổ Mãn Châu.

2 Ben-gan: Bengal, khu vực nằm ở đông bắc của Tiểu lục địa Ấn Độ. Ngày nay, khu vực này chủ yếu được phân chia giữa Bangladesh và bang Tây Bengal của Ấn Độ.

ĐẶC TÍNH VÀ SINH HOẠT CỦA HỔ

Con vật ăn thịt sống, dữ tợn và nham hiểm, thường sống và đi ăn một mình, trừ thời kì hôn phối. Nó là chúa sơn lâm của các vùng rừng Việt Nam, Đông Dương và châu Á nói chung. Trên bản đồ động vật thế giới, vùng cư trú của hổ phân bố từ Ba Tư, Tuyếc-kít-xtăng¹ đến tận Trung Quốc, nhiều nhất ở Ben-gan, Mã Lai, Đông Dương, Gia-va, và Su-ma-tra², Ba-li.

Tuy nhiên, ngày nay thỉnh thoảng người ta vẫn thấy hổ xuất hiện ở vài vùng lạnh lẽo, băng giá ở Á châu. Chúng thường hoạt động trên các vùng bắc Á châu, tận miền đông nam Tây Bá Lợi Á³, vùng sông Hắc Long Giang (địa phận Mãn Châu) đến tận Ấn Độ, sang đến phía tây nam và phía nam biển Cát-xpien (thuộc Liên Xô).

Ở Tích Lan⁴, Tây Tạng và đảo Boóc-nê-ô không thấy có giống “mèo khổng lồ” này. Còn trên lục địa Phi châu và Mĩ châu thì ngày nay, loài giống hổ đã bị hoàn toàn tuyệt diệt.

1 Tuyếc-kít-xtăng: Turkestan, hay còn gọi là Turkistan hay Türkistan, một khu vực ở Trung Á. Trong khu vực này có một số thành phố lớn thuộc nền văn minh Ba Tư.

2 Su-ma-tra: Sumatra, hòn đảo lớn thứ sáu thế giới và là hòn đảo lớn nhất có lãnh thổ thuộc Indonesia.

3 Tây Bá Lợi Á: Cách gọi cũ của từ Siberi, vùng đất thuộc Nga.

4 Tích Lan: Sri Lanka.